
La prévalence du VIH : résultats de EDSN-MICS IV 2012


Au cours de l'Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples réalisée au Niger en 2012, 91 % des femmes éligibles de 15 à 49 ans et 80 % des hommes éligibles de 15 à 59 ans ont été testés pour le VIH. Les résultats montrent que 0,4 % des personnes testées de 15-49 ans sont infectées par le VIH.

Prévalence du VIH selon le milieu de résidence




La prévalence du VIH est la même chez les femmes et chez les hommes (0,4 %). La prévalence est quatre fois plus élevée en milieu urbain (0,8 %) qu'en milieu rural (0,2 %).

Tendances de la prévalence du VIH



La prévalence du VIH dans la population de 15-49 ans a baissé de 0,7 % en 2006 à 0,4 % en 2012. Les changements observés dans la prévalence du VIH chez les femmes et chez les hommes ne sont pas statistiquement significatifs.



En général, les femmes sont infectées plus précocement que les hommes. Les taux d'infection atteignent 0,8 % à 30-34 ans et 40-44 ans chez les femmes et 1,0 % à 45-49 ans chez les hommes.

Prévalence du VIH par région


Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans séropositifs

Niger 0,4 %

Agadez 0,5 %
Diffa 0,7 %
Tahoua 0,3 %
Zinder 0,2 %
Tillaberi 0,2 %
Maradi 0,2 %
Dosso 0,5 %
Niamey 1,1 %

La prévalence du VIH est plus élevée à Niamey (1,1 %) et plus faible dans les régions de Tillaberi, Maradi et Zinder (0,2 %, chacune).

Prévalence du VIH selon le statut matrimonial




Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

La prévalence du VIH est plus élevée parmi les veuves (3,2 %) et les divorcées (1,7 %).

8 % des femmes et 3 % des hommes ont reçu le résultat du dernier test du VIH effectué au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête.

Prévalence du VIH selon le niveau d'instruction




La prévalence du VIH est plus élevée parmi les femmes et les hommes ayant un niveau primaire (respectivement, 1,3 % et 1,0 %).



Prévalence du VIH selon le niveau de bien-être économique du ménage

Femmes 15-49 Hommes 15-49


Pourcentage



La prévalence du VIH est plus élevée parmi les femmes et les hommes vivant dans un ménage des deux quintiles les plus élevés.

Prévalence du VIH parmi les jeunes de 15-24 ans

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-24 ans séropositifs



La prévalence du VIH parmi les jeunes âgés de 15-24 ans est de 0,1 %.

Taux de réponse et méthodologie : *Les données sur la prévalence du VIH ont été obtenues à partir d'un échantillon de gouttes de sang séché, prélevées volontairement par piqûre au bout du doigt auprès des femmes de 15-49 ans et des hommes de 15-59 ans. Près de 90 % des femmes et 79 % des hommes ont été testés. Dans l'ensemble, 85 % des 10 134 enquêtés ont été testés.*

Pour tous renseignements concernant l'EDSN-MICS IV 2012, contacter :

Au Niger :
Institut National de la Statistique
BP 13416, Niamey, Niger
Téléphone : (227) 20 72 35 60, Fax : (227) 20 72 2174
Email : ins@ins.ne ; Internet : www.ins.ne).

Aux États-Unis :
ICF International
11785 Beltsville Drive
Calverton, MD 20705 USA
Téléphone : 301-572-0200; Fax : 301-572-0999
www.measuredhs.com

La quatrième Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples du Niger (EDSN-MICS IV) a été réalisée de février à juin 2012 par l'Institut National de la Statistique (INS), Ministère des Finances, en collaboration avec les services techniques du Ministère de la Santé Publique et le Laboratoire National de référence des IST/VIH/TB. L'EDSN-MICS IV 2012 a été financée par le Gouvernement du Niger, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), la Banque Mondiale par le biais du Projet Démographique Multisectoriel (PRODEM), le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), KFW par l'intermédiaire de la Coordination Intersectorielle de Lutte contre le VIH/SIDA et l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). En outre, ICF International a fourni l'assistance technique dans le cadre d'un contrat de services avec l'INS.















kfw ENTWICKLUNGSBANK

ICF INTERNATIONAL



Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples Niger 2012



VIH/sida